

2013 일반수학 2 중간고사 답안지

단답형

1. $\left(\frac{1}{2}, \frac{\pi}{6}\right), (0, 0), \left(-\frac{1}{2}, \frac{\pi}{6}\right)$ 혹은 $\left(\frac{1}{2}, \frac{\pi}{6}\right), (0, 0), \left(\frac{1}{2}, \frac{7\pi}{6}\right)$. 단 원점은 $(0, \theta)$ (θ 는 임의의 실수)라고 써도 무방함.

2. $\frac{35}{3}$

3. $y = -\pi x - 1$ or $y = -\pi\left(x + \frac{1}{\pi}\right)$

4. $\sqrt{168}$ or $2\sqrt{42}$

5. $z = \frac{3}{2}, \sqrt{x^2 + y^2} = 3\frac{\sqrt{3}}{2}$ or $z = \frac{3}{2}, x^2 + y^2 = \frac{27}{4}$

6. $g_u(0, 0) = 7, g_v(0, 0) = 2$

7. $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{2x - yze^{xyz}}{xye^{xyz} - 2z}$ 혹은 $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{yze^{xyz} - 2x}{2z - xye^{xyz}}$

8. $\frac{3\sqrt{10}}{2}$

9. $\frac{\sqrt{13}}{13}$ 혹은 $\frac{1}{\sqrt{13}}$

10. $\pi - 4\sqrt{2} + 8$

$$11. f(x,y) = \begin{cases} \frac{xy^3 - x^3y}{x^2 + y^2} & ((x,y) \neq (0,0)) \text{ 일 때} \\ 0 & ((x,y) = (0,0)) \end{cases}$$

편도함수의 정의에 의해 $f_x(0,y)$, $f_y(x,0)$, $f_{xy}(0,0)$ 과 $f_{yx}(0,0)$ 를 구하여라.
풀이)

$$\begin{aligned} f_x(0,y) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h,y) - f(0,y)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{hy^3 - h^3y}{h^2 + y^2} - 0}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{y(y^2 - h^2)}{h^2 + y^2} = y \text{ 이고 } f_x(0,0) = 0. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f_y(x,0) &= \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(x,0+k) - f(x,0)}{k} = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{\frac{xk^3 - x^3k}{x^2 + k^2} - 0}{k} \\ &= \lim_{k \rightarrow 0} \frac{x(k^2 - x^2)}{x^2 + k^2} = -x \text{ 이고 } f_y(0,0) = 0 \end{aligned}$$

$$f_{xy}(0,0) = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f_x(0,0+k) - f_x(0,0)}{k} = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{k - 0}{k} = 1.$$

$$f_{yx}(0,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f_y(0+h,0) - f_y(0,0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-h - 0}{h} = -1.$$

12. 두 직선 $l_1: x=y=z$ 와 $l_2: x+1=\frac{y}{2}=\frac{z}{3}$ 사이의 거리를 구하시오.

(풀이)

직선 l_1 의 방향벡터 $\vec{v}_1 = \langle 1, 1, 1 \rangle$ 이고

직선 l_2 의 방향벡터 $\vec{v}_2 = \langle 1, 2, 3 \rangle$ 이므로

평행하지 않으며 또한, 두 직선의 교점이 없다.

즉, 두 직선은 꼬인 위치에 있다.

따라서 두 직선사이의 거리는

직선 l_1 위의 한 점을 $P_1 = (1, 1, 1)$,

직선 l_2 위의 한 점을 $P_2 = (-1, 0, 0)$ 라 할 때,

벡터 $\vec{P_1P_2} = \langle -2, -1, -1 \rangle$ 를

두 직선 l_1, l_2 에 서로 수직인

벡터 $\vec{n} = \vec{v}_1 \times \vec{v}_2 = \langle 1, -2, 1 \rangle$

방향으로의 정사영 벡터의 크기가 된다.

따라서 두 직선사이의 거리

$$D = |\text{comp}_{\vec{n}} \vec{P_1P_2}| = \frac{|\vec{P_1P_2} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|} = \frac{1}{\sqrt{6}} \text{ 이다.}$$

13. 함수 $f(x, y, z) = x^3 + y^3 + z^3 - 9xyz$ 와 변수 t 에 대하여, 등식 $f(tx, ty, tz) = t^3 f(x, y, z)$ 이 성립함을 확인하고, 위 성질과 연쇄법칙을 이용하여

$$x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} + z \frac{\partial f}{\partial z} = 3f(x, y, z) \text{이 성립함을 보여라.}$$

(풀이)

주어진 함수 f 에 대하여

$$f(tx, ty, tz) = t^3(x^3 + y^3 + z^3 - 9xyz) = t^3 f(x, y, z) \text{이}$$

성립한다.

$x_1 = tx, y_1 = ty, z_1 = tz$, 이라고 두고서,

식 $f(tx, ty, tz) = t^3 f(x, y, z)$ 의 양변을 t 에 관하여 미분하면 연쇄법칙에 의해

$$\frac{\partial f(tx, ty, tz)}{\partial t} = x \frac{\partial f}{\partial x_1} + y \frac{\partial f}{\partial y_1} + z \frac{\partial f}{\partial z_1} = 3t^2 f(x, y, z) \text{을 얻는다.}$$

양변에 $t = 1$ 을 대입하면

$$x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} + z \frac{\partial f}{\partial z} = 3f(x, y, z) \text{이 나온다.}$$

언급사항:

연쇄법칙을 사용하지 않고 편미분을 구해서 직접적으로 계산할 수 있다. (점수 차감)

14. 극좌표로 표현된 곡선 $r = 2 + \sqrt{3} \cos \theta$ 의 내부와 곡선 $r = 3 - \sin \theta$ 의 외부에 놓인 영역의 넓이를 구하여라.

(풀이)

우선 교점을 구하기 위해


$2 + \sqrt{3} \cos \theta = 3 - \sin \theta$ 를 푼다.

$$2 \sin \left(\theta + \frac{\pi}{3} \right) = \sqrt{3} \cos \theta + \sin \theta = 1$$

이므로 $\sin \left(\theta + \frac{\pi}{3} \right) = \frac{1}{2}$ 이다.

그러므로 $\theta = -\frac{\pi}{6}$ 또는 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 이다. 그러므로 구하려는 넓이는

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} \int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} (2 + \sqrt{3} \cos \theta)^2 d\theta - \frac{1}{2} \int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} (3 - \sin \theta)^2 d\theta \\ &= \frac{1}{2} \int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} (-5 + 4\sqrt{3} \cos \theta + 6\sin \theta + 3\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) d\theta \\ &= \frac{1}{2} \int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} (-4 + 4\sqrt{3} \cos \theta + 6\sin \theta + 2\cos(2\theta)) d\theta \\ &= -\frac{4\pi}{3} + \frac{19}{4} \sqrt{3} \end{aligned}$$



15. 곡면 $xyz = 4$ 위의 한 점 $P(x_0, y_0, z_0)$ 에서 곡면에 접하는 접평면과 xy 평면, yz 평면, xz 평면으로 둘러싸인 사면체의 부피를 구하여라. (단, $x_0, y_0, z_0 > 0$ 이다.)

(풀이) $F = xyz - 4$ 라 하고, 점 $P(x_0, y_0, z_0)$ 에서 $F(x, y, z) = 0$ 에 접하는 접평면의 방정식을 구하자.

$$\nabla F = \langle yz, xz, xy \rangle$$

이므로

$$\nabla F(x_0, y_0, z_0) = \langle y_0 z_0, x_0 z_0, x_0 y_0 \rangle$$

이고 접평면의 방정식은

$$y_0 z_0 (x - x_0) + x_0 z_0 (y - y_0) + x_0 y_0 (z - z_0) = 0$$

이다. 점 $P(x_0, y_0, z_0)$ 는 곡면 $F = 0$ 위의 점이므로 한편,

$$x_0 y_0 z_0 = 4 \text{ 이다.}$$

따라서, 접평면의 방정식을 다시 나타내면

$$y_0 z_0 x + x_0 z_0 y + x_0 y_0 z = 12 \text{ 또는 } \frac{x}{x_0} + \frac{y}{y_0} + \frac{z}{z_0} = 3 \text{ 이다.}$$

사면체는 $(0, 0, 0), (3x_0, 0, 0), (0, 3y_0, 0), (0, 0, 3z_0)$ 를 꼭지점으로 하는 사면체이다.

$$\begin{aligned} \text{따라서 사면체의 부피는 } \frac{1}{6}(3x_0)(3y_0)(3z_0) &= \frac{9}{2}x_0 y_0 z_0 \\ &= 18 \end{aligned}$$

으로 점 P 와 무관하게 항상 18이다